



SAATZUCHT DÜDINGEN



Getreidesorten für die Ernte 2026



saatgut schweiz
semence suisse

Brotgetreide / Futterweizen

Sorte	Qualitäts- klasse nach swiss granum ¹⁾	Pro- duktions- typ	Körnerertrag		Hekto- liter- ge- wicht	Frühreife beim Ähren- schieben	Pflanzen- länge	Stand- festig- keit	Protein- gehalt	Aus- wuchs	Empfoh- lene Saat- menge kg / a	Krankheitsresistenz						
			Ext. ²⁾	ÖLN ³⁾								Mehl- tau	Gelb- rost	Braun- rost	Septoria nodorum		Sept. tritici ⁴⁾	Fusa- rien Ähre ⁴⁾
															Blatt ⁴⁾	Ähre ⁴⁾		

Winterweizen

Axen ^{B)}	TOP	ÖLN	+	++	++	sf	l	-	+++	+	1,8-2,1	+	-	-	Ø	++	Ø	-
Baretta	TOP	ÖLN	-	Ø	Ø	s	ml	+	++	-	1,8-2,1	Ø	+	-	-	+	-	Ø
Bodeli ^{B)}	TOP	ÖLN & BIO	+	-	Ø	mf	ml	++++	++++	Ø	1,8-2,1	++	+	-	-	-	-	Ø
Bonavau ^{B)}	TOP	ÖLN	+	Ø	Ø	ms	k	+++	+++	+	1,8-2,1	++	Ø	-	Ø	+	++	-
Cadlimo	TOP	ÖLN	+	Ø	+++	ms	ml	+	++	Ø	1,8-2,1	+++	+	++	+	Ø	Ø	-
Caminada ^{B)}	TOP	ÖLN	+	+	++	f	ml	Ø	+++	+	1,8-2,1	++	Ø	-	+++	-	++	+
CH Claro *	TOP	ÖLN	-	+	Ø	mf	mk	+++	+++	-	1,8-2,1	+	-	Ø	--	-	--	-
Diavel	TOP	ÖLN & BIO	Ø	Ø	+++	sf	l	+	++	Ø	1,8-2,1	+	-	Ø	+	+	+++	Ø
Montalbano ^{B)}	TOP	ÖLN & BIO	Ø	-	+	s	mk	++++	+++	++	1,8-2,1	+	Ø	Ø	+	+++	Ø	++
CH Nara	TOP	ÖLN & BIO	-	-	+++	mf	sk	++++	++	++	1,8-2,1	++	++	Ø	+	Ø	Ø	--
Piznair	TOP	ÖLN & BIO	Ø	Ø	++	ms	m	+	+++	+	1,8-2,1	++	+	Ø	Ø	Ø	---	Ø
Prim ⁵⁾	TOP	BIO	Ø		++	f	l	Ø	++	+	2,0-2,5		Ø	Ø	Ø		Ø	Ø
Rosatch ^{B) 5)}	TOP	BIO	+		+++	s	m	++	++	+	2,0-2,5		+	Ø	Ø	Ø	Ø	+
Runal	TOP	ÖLN	--	---	+	ms	m	+	+++	+(+)	1,8-2,1	Ø	Ø	---	-	Ø	---	+
Wital ⁵⁾	TOP	BIO	++		++	f	l	Ø	Ø	+	2,0-2,5		+	+	+			Ø
Wiwa ⁵⁾	TOP	BIO	Ø		+++	s	l	Ø	+	++	2,0-2,5		-	--	Ø			++
Alpval	I	ÖLN	++	+	+	s	m	++++	+	+	1,8-2,1	+++	++	Ø	Ø	Ø	+	-
Arina	I	ÖLN	--	-	+++	s	sl	--	++	Ø	1,8-2,1	-	-	---	-	+	+	++
Campanile	I	ÖLN	++	+	+	ms	m	+	+	+	1,8-2,1	++	+++	+	+++	Ø	+	Ø
Forel	I	ÖLN	-	Ø	+	mf	m	++	+	+	1,8-2,1	Ø	Ø	---	--	++	--	--
Hanswin	I	ÖLN	Ø	Ø	+++	mf	m	Ø	+	+	1,8-2,1	-	Ø	--	-	+	--	--
Posmeda	II	ÖLN	+++	+++	+++	mf	l	Ø	Ø	+	1,8-2,1	+	Ø	-	-	Ø	++	Ø
Spontan	II	ÖLN	+++	+++	+	ms	m	+++	Ø	+	1,8-2,1	+++	++	--	Ø	+	++	Ø
Dilago	Biskuit	ÖLN	+++	+++	+++	ms	mk	++		Ø	1,8-2,1	+	Ø	-	-	++	+	Ø

* Beurteilung basierend auf Versuchen 2022

^{B)} begrannte Ähren

Futterweizen

Campesino	Futter	ÖLN	++++	++++	-	f	k	++++	--	+	1,8-2,1	++	++	++	+	+	++	Ø
Poncione	Futter	ÖLN & BIO	+++	++++	-	s	ml	-	Ø	-	1,8-2,1	+++	++	+	++	++	+	Ø
Spontan	Futter	BIO	+++	+++	+	ms	m	+++	Ø	+	1,8-2,1	+++	++	--	Ø	+	++	Ø

Sommerweizen

Diavel *	TOP	ÖLN & BIO	++		++	ms	ml	++	++	+	2,0-2,2	Ø	Ø	++	++	+	++	+
Gagnone	I	ÖLN	+++		+++	f	ml	++	+++	+	2,0-2,2	+	+	+	++	+	++	Ø

* kann im Herbst ausgesät werden

SAATZUCHT DÜDINGEN



Hägliweg 1
3186 Düdingen
www.saatgut.ch

Brotgetreide / Futtergetreide

Sorte	Pro- duktions- typ	Körnerertrag		Hekto- liter- ge- wicht	Frühreife beim Ähren- schieben	Pflanzen- länge	Stand- festig- keit	Protein- gehalt	Empfoh- lene Saatmen- ge kg / a	Krankheitsresistenz						
		Ext. 2)	ÖLN 3)							Mehl- tau	Gelb- rost	Braun- rost	Septoria nodorum		Sept. tritici 4)	Fusa- rien Ähre 4)
													Blatt 4)	Ähre 4)		

Winterroggen															Winterfestigkeit
Recrut ⁵⁾	BIO	Ø			mf	l	++	+	1,6–1,8	+		+			
KWS Serafino (Hybrid)	ÖLN	+++		++	mf	mk	++	+	1,0–1,3	+	Ø	+			+
Elias ^{* 5)}	BIO	+		+	f	l			1,6–1,8						

* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

Dinkel															Winterfestigkeit
Edelweisser*	BIO	++		++	sf	ml	+++	++	2,0–2,4	+++	Ø	--	++	+	++
Oberkulmer	ÖLN & BIO	--		++	ms	sl	---	+++	1,8–2,1	++	Ø	--	+	+	++
Ostro	ÖLN & BIO	--		+++	ms	sl	-	+++	1,8–2,1	++	---	-	Ø	+	++

* für die Marke UrDinkel oder IG Dinkel nicht zugelassen

Sorte	Körnerertrag		Pro- duktions- typ	Hekto- liter- gewicht	Frühreife beim Ähren- schieben	Frühreife bei der Ernte	Pflanzen- länge	Stand- festig- keit	Protein- gehalt	Empfoh- lene Saat- menge kg / a	Krankheitsresistenz						
	Ext. 2)	ÖLN 3)									Mehltau	Netz- fleck- en	Blatt- fleck- en	Gelbm- saisk	Braunrost	Sprenkel- nekrosen	Winter- festigkeit

Wintergerste zweizeilige Sorten																		
Aleksandra	+	++	ÖLN	+++	mf	s	mk	-	+	1,5 – 1,8	++	+++	+++	t	++	Ø	Ø	
Arthene	++	++	ÖLN	+++	ms	s	k	++	++	1,5 – 1,8	++	++	+++		+	Ø	+	
KWS Cassia *	-	-	ÖLN	++	s	ms	k	+	+	1,5 – 1,8	Ø	+(+)	+(+)	t	++	+(+)	Ø	
SU Celly **	+	Ø	ÖLN	+	sf	ms	k	+	+++	1,5 – 1,8	++	+++	++		++	Ø	Ø	
SU Laubella	Ø	Ø	ÖLN & BIO	Ø	f	ms	k	-	++	1,5 – 1,8	++	++	+++		+	Ø	++	

mehrzeilige Sorten

Esprit	+++	+++	ÖLN & BIO	Ø	mf	mf	l	+	+	1,2 – 1,5	+	Ø	+		+	+	++	
KWS Higgins *	Ø	+	ÖLN	Ø	ms	f	ml	Ø	+	1,2 – 1,5	+	Ø	+	t	-	+	++	
Integral †	+++	++	ÖLN	+	f	ms	mk	+++	++	1,2 – 1,5	-	+	+		+	Ø	++	
KWS Orbit	Ø	Ø	ÖLN	Ø	mf	f	m	+	Ø	1,2 – 1,5	+	-	-		-	Ø	++	
SY Galileoo (Hybrid)	+++	+++	ÖLN	+	ms	f	l	Ø	Ø	0,7 – 1,0	++	+	+		Ø	+	++	
Loona (Hybrid)	+++	++	ÖLN	++	s	ms	ml	+	+	0,7 – 1,0	++	+	+++		+	++	++	

t = tolerant bzw. resistent gegen gewisse Pathotypen

* Beurteilung basierend auf Versuchen bis 2022

† = Gelbverzwergungsvirus tolerante Sorte

** Beurteilung basierend auf Versuchen bis 2023

Sommergerste zweizeilige Sorten																		
KWS Atrika	+++		ÖLN & BIO	+(+)	ms	ms	mk	+++	+	1,5 – 1,8	+++	++	++					

											Krankheitsresistenz			Spelzenbräune		Fusarien
											Mehltau	Gelbrost	Braunrost	Blatt	Ähre	Ähre
Villars	Ø		ÖLN	+++	sf	f	m	-	+	2,0 – 2,2	++	-	+++	+	++	+

Pflanzenlänge

sk = sehr kurz
k = kurz
mk = mittel bis kurz
m = mittel
ml = mittel bis lang
sl = sehr lang
l = lang

Frühreife

sf = sehr früh
f = früh
mf = mittelfrüh
ms = mittelspät
s = spät

Legende:

++++ = ausgezeichnet
+++ = sehr gut
++ = gut
+ = mittel bis gut

Ø = mittel
- = mittel bis schwach
-- = schwach
--- = sehr schwach

1) Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2026. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich
2) Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)
3) Ergebnisse aus Praxis-Anbauversuchen (ÖLN) nur für Winter- und Futterweizen sowie Wintergerste
4) Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, Ø, -, --)
5) Nicht mehr auf der empfohlenen Sortenliste swiss granum

Futtergetreide / Eiweisserbsen

Sorte	Körnerertrag		Pro- duktions- typ	Hekto- liter- gewicht	Frühreife beim Ähren- schieben	Frühreife bei der Ernte	Pflanzen- länge	Stand- festig- keit	Protein- gehalt	Empfohlene Saatmenge kg / a	Krankheitsresistenz					
	Ext. 2)	ÖLN 3)									Mehl- tau	Gelb- rost	Braun- rost	Spelzenbräune		
														Blatt	Ähre	Ähre

Wintertriticale

Balino	++		ÖLN & BIO	++	ms	ms	m	++	+	1,8 – 2,1	+++	++	+	++	Ø	+
Kitesurf**	+++		ÖLN	++	mf	mf	sl	++	+		+++		++	++		+
Larossa	Ø		ÖLN	-	sf	f	ml	+++	+	1,8 – 2,1	++	+++	++	++	Ø	Ø
Tender* 5)	+		ÖLN			mf	sl	+	+	1,8 – 2,1						
Triangoli	++		ÖLN	+	mf	f	ml	+++	+	1,8 – 2,1	++	++	+++	++	++	+

Tender im Grünschnitt-Angebot

* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

** Die Sortenbeschreibung basiert auf dreijährigen Durchschnittsresultaten des Forschungsprojektes Triticale+. Die Krankheitsbonitierungen der Sorten basieren auf natürlichen Infektionen und nicht auf künstlichen Inokulationen wie in den offiziellen Sortenversuchen.

Winterhafer

Auswinterung															
Eagle*	+++		ÖLN & BIO	+	f	f		Ø	+	1,2 – 1,5	+			Ø	

* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

Sommerhafer

Grünschnitt-eignung													Kornfarbe
Canyon	++		ÖLN & BIO	+	mf	mf	sl	-	Ø	1,3 – 1,5	++	+	gelb
Husky	++		ÖLN & BIO	++	mf	ms	l	Ø	+	1,3 – 1,5	++	+	weiss
Lion	++		ÖLN	++	mf	ms	m	Ø	Ø	1,3-1,5	+	++	gelb

Eiweisserbsen	Produktions- typ	Ertrag	Erntbarkeit	Proteingehalt	Blühbeginn	Frühreife bei Ernte	Empfohlene Saatmenge kg / a	Bestandes- höhe	Tausendkorn- gewicht
Astronaut	ÖLN & BIO	+++	++	++	f	f	2,5	hoch	m
Kameleon	ÖLN	+++	++	+++	mf	mf	2,5	ml	m
Orchestra	ÖLN	+++	++	+++	f	mf	2,5	hoch	hoch

* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

Art	Empfohlene Saatzeit	Saattiefe (cm)	Saatlücke (Körner je m²)		
			Zeitpunkt / Bedingungen früh / optimale	Zeitpunkt / Bedingungen normal / mittlere	Zeitpunkt / Bedingungen spät / schwierige
Winterweizen	Mitte Oktober bis Mitte November	2 – 4	300	400	500
Korn / Dinkel (Fesen / m²)	ab Anfang Oktober bis Anfang Dezember	3 – 5	150	175	200
Winterroggen	Ende September bis Anfang Oktober	1 – 2	250	300	350
Hybridroggen	Ende September bis Anfang Oktober	1 – 2	225	275	325
Wintergerste 2-zeilige Sorten 6-zeilige Sorten	ab Mitte September bis Mitte Oktober	2 – 4 2 – 4	275 275	350 300	425 375
Wintertriticale	Anfang bis Ende Oktober	1 – 2	275	350	425
Winterhafer	zweite Hälfte September bis Anfang Oktober	3 – 5	275	350	425
Sommerweizen	Februar bis Ende März, möglichst früh	2 – 4	350	450	550
Sommergerste	Mitte März bis Anfang Mai	2 – 4	275	350	475
Sommertriticale	Februar bis Ende März, möglichst früh	1 – 2	325	400	475
Sommerhafer	Februar bis Ende März, möglichst früh	3 – 5	325	400	475
Sommereiweisserbsen	Februar bis Mitte April	3 – 5	60	70	80

